

VETLOG

CATÁLOGO DE PRODUTOS

zoetis





REVOLUTION



Cod: 1 Pipeta 15mg, 414

Cod: 1 Pipeta 30mg, 416

Cod: 1 Pipeta 45mg, 415

Cod: 1 Pipeta 60mg, 417

Cod: 1 Pipeta 120mg, 418

Cod: 1 Pipeta 240mg, 419

Cod: CX 3 pipetas 120mg, 424

Cod: CX 3 pipetas 15mg, 420

Cod: CX 3 pipetas 240mg, 413

Cod: CX 3 pipetas 30mg, 422

Cod: CX 3 pipetas 45mg, 421

Cod: CX 3 pipetas 60mg, 423

Indicação

Tratamento e prevenção de pulgas, sarnas, vermes intestinais, piolhos e dirofilariose em cães e gatos a partir de 6 semanas de idade. Auxilia no controle de carrapatos e na dermatite alérgica por picada de pulgas.

Apresentação

Pipetas de 6% e 12%.
Gatos: 15 mg e 45 mg
Cães: 15 mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg
Caixas com 1 ou 3 pipetas.

Posologia

Aplicação tópica mensal. Aplicar diretamente na pele, em um único ponto, com dose mínima de 6 mg/kg.



SIMPARIC



Cod: CX 5mg 3 comprimidos, 1675

Cod: CX 10mg 3 comprimidos, 1676

Cod: CX 20mg 3 comprimidos, 1680

Cod: CX 40mg 3 comprimidos, 1677

Cod: CX 80mg 3 comprimidos, 1679

Cod: CX 120mg 3 comprimidos, 1678

Cod: 120mg 1 comprimido, 1743

Cod: 20mg 1 comprimido, 1744

Cod: 40mg 1 comprimido, 1741

Cod: 5mg 1 comprimido, 1739

Cod: 80mg 1 comprimido, 1742

Indicação

Antiparasitário oral indicado para cães a partir de 8 semanas e 1,3 kg. Trata e previne pulgas, carrapatos e as sarnas sarcóptica, otodécica e demodécica.

Apresentação

Comprimidos de 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg e 120 mg. Caixas com 1 ou 3 comprimidos.

Posologia

Administração oral mensal. Protege contra pulgas e carrapatos por até 35 dias e trata sarnas com doses mensais. Altamente palatável.

SIMPARIC TRIO

Cod: 3mg 1 comprimidos, 6659

Cod: 6mg 1 comprimidos, 6660

Cod: 12mg 1 comprimidos, 6661

Cod: 24mg 1 comprimidos, 6662

Cod: 48mg 1 comprimidos, 6663

Cod: 72mg 1 comprimidos, 6664



Cod: 3mg 3 comprimido, 6665

Cod: 6mg 3 comprimido, 6666

Cod: 12mg 3 comprimido, 6667

Cod: 24mg 3 comprimido, 6668

Cod: 48mg 3 comprimido, 6669

Cod: 72mg 3 comprimido, 6670

Indicação

Antiparasitário oral indicado para cães a partir de 8 semanas e 1,3 kg. Trata e previne pulgas, carrapatos e as sarnas sarcóptica, otodécica e demodécica.

Apresentação

Comprimidos de 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg e 120 mg. Caixas com 1 ou 3 comprimidos.

Posologia

Administração oral mensal. Protege contra pulgas e carrapatos por até 35 dias e trata sarnas com doses mensais. Altamente palatável.

ECTOFEND



Indicação

Coleira antiparasitária para cães a partir de 10 semanas de idade, com ação repelente contra o mosquito-palha (transmissor da leishmaniose) e pulgas por até 6 meses e contra carrapatos por até 8 meses, sendo feito carrapaticida por 5 meses + 3 meses como auxiliar no controle do carrapato.

Apresentação

48 cm (para pequeno e médio portes), 65 cm (para cães de grande porte). Ambas as apresentações possuem opção de fivela na cor azul e rosa.

Posologia | Modo de usar

A coleira deve ser colocada de forma justa, deixando um espaço no qual seja possível colocar dois dedos entre ela e o pescoço do cão. Prenda a pontada da coleira na fivela e corte a porção excedente, mantendo ao menos 2 cm de coleira livre após a fivela.

Indicação

Uso tópico em gatos a partir de 8 semanas de idade, sem peso mínimo. Tratamento, prevenção e controle de infestações por pulgas e carrapatos, controle da dermatite alérgica por picada de pulgas (DAPP), prevenção da dirofilariose (também conhecida como doença do verme do coração), tratamento e controle da sarna de orelha e tratamento e controle de vermes intestinais.



Apresentação

Caixas com 1 e 3 pipetas. Para gatos com pesos de 2,5; 2,6-5 e 5,1-10 kg.

Posologia | Modo de usar

A aplicação deve ser feita diretamente na pele, afastando os pelos, em um único ponto, com intervalos de 35 dias.



PRO HEART SR 12

Cod: 8ml, 1420



Indicação

Preventivo injetável para dirofilariose canina. Também trata infecções por *Ancylostoma caninum* (formas larval e adulta). Indicado para cães a partir de 6 meses.

Apresentação

2 frascos - microesferas de moxidectina 10% + diluente estéril para reconstituição.

Posologia

Dose: 0,5 mL/10 kg (equivalente a 0,5 mg/kg) por via subcutânea. Cães >60 kg: dividir aplicação em mais de um ponto.



VANGUARD PLUS

Cod: 398



Administra com 3 doses iniciais e revacinação anual.
Dose de 1 mL por animal, independentemente do peso.

Indicação de:

3 doses com intervalo de 3 semanas entre cada administração, nos casos de primovacinação. Recomenda-se reforço anual com dose única.

PLUS: Leptospirose (*L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona* e *L. grippityphosa*)

VANGUARD HTLP S/CV L

Cod: 400



Administra com 3 doses iniciais e revacinação anual.
Dose de 1 mL por animal, independentemente do peso.

Indicação de:

3 doses com intervalo de 3 semanas entre cada administração, nos casos de primovacinação. Recomenda-se reforço anual com dose única.

HTLP: ptospirose (*L. canicola* e *L. icterohaemorrhagiae*)

VANGUARD B ORAL

Cod: 4156



Aplicar dose única de 1 mL por via oral, na face interna da bochecha. Recomenda-se revacinação anual.

Indicação

Vacina oral indicada para cães saudáveis a partir de 8 semanas de idade, na prevenção da traqueobronquite infecciosa canina (tosse dos canis) causada por Bordetella bronchiseptica.

VANGUARD I LLL

Cod: 5152



Aplicar 0,5 mL da vacina reidratada em uma única narina, por via intranasal. Revacinação anual é recomendada.

Indicação

Vacina intranasal para cães e filhotes a partir de 8 semanas, na prevenção da traqueobronquite infecciosa canina (tosse dos canis) causada por adenovírus tipo 2, parainfluenza e Bordetella bronchiseptica.

BRONCHIGUARD

Cod: 402



Aplicar 1 mL por via subcutânea. Esquema inicial de 2 doses, com intervalo de 2 a 4 semanas. Revacinação anual com dose única.

Indicação

Vacina subcutânea para cães saudáveis a partir de 8 semanas, na prevenção da traqueobronquite infecciosa canina (tosse dos canis) causada por Bordetella bronchiseptica.

GIARDIA VAX

Cod: 407



Aplicar uma dose de 1 mL por via subcutânea. Uma segunda dose deve ser aplicada de 2 a 4 semanas após a primeira vacinação. Recomenda-se a revacinação anual.

Indicação

Vacina inativada contra giardíase canina, para vacinação de cães saudáveis a partir de 8 semanas de idade.

DEFENSOR

Cod: 399



Aplicar 1 mL em animais acima de 3 meses, por via subcutânea (cães e gatos) ou intramuscular (apenas cães). Repetir após 1 ano e anualmente depois disso.

Indicação

Para vacinação de animais sadios (cães e gatos) como auxiliar na prevenção da raiva.

FELOCELL FELV

Cód: 5249



Administrar 1 mL por via subcutânea. Repetir a dose após 3 a 4 semanas. Recomendado reforço anual com dose única.

Indicação

Para auxiliar na prevenção da viremia persistente, tumores linfoides causado pelo vírus da leucemia felina (FeLV) e doença associadas a infecção causada pelo FeLV.



LIBRELA



Cod:5mg Frasco, 1ml, 5136

Cod:10mg Frasco, 1ml, 5137

Cod:15mg Frasco, 1ml, 5138

Cod:20mg Frasco, 1ml, 5139

Cod:30mg Frasco, 1ml, 5140

(Para cães a partir de 1 ano de idade)

Indicação

Tratamento da dor associada à osteoartrite em cães.

Apresentação

5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg e 30 mg. Caixa com 2 frascos de 1 mL. Conservação: 2°C a 8°C.

Posologia

Dose de 0,5 a 1 mg/kg por via subcutânea, uma vez por mês. Para cães com menos de 5 kg, aplicar 0,1 mL/kg do frasco de 5 mg/mL, descartando o restante. Para cães entre 5 e 60 kg, aplicar 1 mL (frasco inteiro).



FELOCELL CRV



Administrar a dose de 1 mL por via intramuscular ou subcutânea.

Indicação

Para vacinação de gatos saudáveis, como auxiliar na prevenção da rinotraqueíte, calicivirose e panleucopenia.

FELOCELL FELV



Cod: 5249

Administrar 1 mL por via subcutânea. Repetir a dose após 3 a 4 semanas. Recomendado reforço anual com dose única.

Indicação

Para auxiliar na prevenção da viremia persistente, tumores linfóides causados pelo vírus da leucemia felina (FeLV) e doenças associadas a infecção causada pelo FeLV.

FELOCELL CRV-C



Administrar a dose de 1 mL por via intramuscular ou subcutânea.

Indicação

Para vacinação de gatos saudáveis, como auxiliar na prevenção da rinotraqueíte, calicivirose, panleucopenia e clamidiose.

SOLENSIA



Cod:7mg, 1ml, 5643

(Para cães a partir de 1 ano de idade)



Indicação

Produto à base de Frunevetmab, indicado para o tratamento da dor associada à osteoartrite em gatos.

Apresentação

Solução injetável. Caixa com 2 frascos de 1 mL cada. Conservação entre 2°C e 8°C.

Posologia

Dose de 1 mg/kg por via subcutânea, uma vez por mês. Indicado para gatos a partir de 2,5 kg. Para gatos acima de 7 kg, utilizar mais de um frasco, extraindo o volume total em uma única seringa.



RIMADYL



Cod:25ml Mast 14 comprimido, 1020

Cod:75ml Mast 14 comprimido, 395

Cod:100ml Mast 14 comprimido, 1019

Cod:Injetavel 20ml, 393

Indicação

Controle da dor associada a cirurgias ortopédicas e de tecidos moles.

Apresentação

Disponível em comprimidos mastigáveis de 25 mg, 75 mg e 100 mg, em frascos com 14 unidades, e na versão injetável a 5%, em frasco de 20 ml com conservação entre 2°C e 8°C.

Posologia

Comprimidos: 4,4 mg/kg uma vez ao dia ou 2,2 mg/kg a cada 12 horas, por via oral.

Injetável: 4,4 mg/kg (1 mL/11,4 kg) uma vez ao dia ou 2,2 mg/kg (0,5 mL/11,4 kg) a cada 12 horas, por via subcutânea.



TROCOXIL



Cod:6mg, 2 comprimidos, 433

Cod:20mg, 2 comprimidos, 434

Cod:30mg, 2 comprimidos, 435

Cod:75mg, 2 comprimidos, 436

Indicação

Indicado para dor e inflamação associadas à doença articular degenerativa em cães, com necessidade de tratamento prolongado.

Apresentação

Comprimidos mastigáveis de 6 mg, 20 mg, 30 mg e 75 mg. Caixa com 2 comprimidos.

Posologia

Dose de 2 mg/kg, por via oral. Repetir 14 dias após a primeira dose e, após isso, administrar uma vez por mês, com limite máximo de 7 doses consecutivas.

Cod:3,6mg, 20 comprimidos, 1581

Cod:5,4mg, 20 comprimidos, 1580

Cod:16mg, 20 comprimidos, 1582

APOQUEL



Indicação

Indicado para o tratamento do prurido associado às dermatites alérgicas e das manifestações clínicas da dermatite atópica em cães.

Apresentação

Comprimidos de 3,6 mg, 5,4 mg e 16 mg, em caixas com 20 unidades.

Posologia

A cada 12h por 14 dias. E para terapia de manutenção (após os 14 dias) a mesma dose administrada (0,4 a 0,6 mg/kg), a cada 24h.

CYTOPOINT



Cod: 10mg Frasco, 1ml, 2945

Cod: 20mg Frasco, 1ml, 2946

Cod: 30mg Frasco, 1ml, 2947

Cod: 40mg Frasco, 1ml, 2948

Indicação

Indicado como auxiliar na redução dos sinais clínicos associados às dermatites alérgicas, inclusive a dermatite atópica em cães.

Apresentação

Solução injetável em caixas com 2 frascos de 1 mL nas apresentações de 10 mg, 20 mg, 30 mg e 40 mg.

Posologia

Aplicar 2 mg/kg por via subcutânea, a cada 4 a 8 semanas. Cães com menos de 2,3 kg recebem 0,2 mL/kg. Acima de 2,3 kg, usar o frasco correspondente conforme peso. Frasco de dose única, descartar após uso.

Cod: comprimido 16 mg, 409

Cod: comprimido 24 mg, 411

Cod: comprimido 60mg, 412

Cod: comprimido 160 mg, 410

Cod: Injetável 20ml, 408

CERENIA



Indicação

Indicado para o tratamento e prevenção de vômitos agudos e para prevenção de enjoo do movimento.

Apresentação

Apresentação injetável é em frasco de 20 mL, contendo 10 mg/mL de citrato de maropitant. A apresentação em comprimidos é em caixas com 4 unidades, disponíveis nas concentrações de 16 mg, 24 mg, 60 mg ou 160 mg.

Posologia

A posologia da solução injetável é de 1 mg/kg, equivalente a 1 mL para cada 10 kg, por via subcutânea, uma vez ao dia, por até cinco dias. Para os comprimidos, a dose é de 2 mg/kg, via oral, uma vez ao dia, por até cinco dias no tratamento de vômito agudo, e de 8 mg/kg, via oral, uma vez ao dia, por até dois dias para enjoo por movimento.

DEXDOMITOR

Cod: Solução 0,5mg/MLX 10ml, 1418



Cães: Sedação e analgesia: 375 µg/m², IV ou 500 µg/m², IM. Medicação pré-anestésica: 125 ou 375 µg/m², IM.
Gatos: Sedação, analgesia e medicação pré-anestésica: 40 µg/kg, IM.

Indicação

Indicado para sedação e analgesia de cães e gatos em procedimentos e exames pouco a moderadamente dolorosos, além de ser utilizado como pré-anestésico antes da anestesia geral.

ANTISEDAN

Cod: Solução 5mg/MLX 10ml, 1419



Aplicação via intramuscular.
Cães: o mesmo volume aplicado de Dexdomitor.
Gatos: metade do volume aplicado de Dexdomitor.

Indicação

Agente para reversão dos efeitos sedativos e analgésicos da dexmedetomidina em cães e gatos.

TELAZOL

Cód: 5ml 426



Indicação

Como anestésico para uso em cães e gatos saudáveis que durem entre 30 e 60 min. Em gatos, é indicado para contenção ou para anestesia combinada com relaxamento muscular e em cães para contenção e pequenas intervenções cirúrgicas de curta duração (média 30 min), que requeiram analgesia suave a moderada.

Apresentação

Solução injetável, frasco com 5 mL, contendo 100 mg/mL da combinação de cloridrato de zolazepam e tiletamina após reconstituição.

Posologia

Para cães, a dose é de 6,6 a 9,9 mg/kg para contenção e de 9,9 a 13,2 mg/kg para pequenas cirurgias. Para gatos, varia de 9,7 a 12,5 mg/kg conforme o procedimento, e de 14,3 a 15,8 mg/kg para cirurgias mais invasivas.